

【いぼ・肌あれ用生薬製剤】

この添付文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読み下さい。

# コイクラセリド<sup>®</sup>

第2類医薬品

- ◆ コイクラセリドは、いぼ・さめ肌・ソバカス・肌あれを改善するように考え出された生薬製剤です。
- ◆ コイクラセリドのヨクイニンはいぼ・肌あれなどを改善するように働き、カンゾウ・カゴソウはヨクイニンの働きを手助けします。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (5) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

## 効能・効果

いぼ、さめ肌、ソバカス、肌あれ

## 用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤4.5g又は3包中

カゴソウ…………… 2.4g	} エキス……………0.90g
ヨクイニン……………12.0g	
カンゾウ末…………… 3.6 g	

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

コイクラセリドは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1