

第2類医薬品

ゴルフアーンG

本品は、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した絆創膏タイプの角質剥離剤です。厚く堅くなった皮膚をやわらかくし、うおのめ、たこ、いぼを取り去ります。又、保護用パッドにより患部を守り、外部からの刺激による痛みをやわらげます。

うおのめ、たこ、いぼとは

	症 状	形状（断面）	治った状態
う お の め	多くは足の裏にでき小豆ぐらいの大きさで中心に白い目があります。肥厚した角質が、くさび状に真皮に向かって入り込むため、大きくなると圧迫により強い痛みを感じます。		中心にある白い目(しん)が完全に取れた時
た こ	足底や手の平に好発し、繰り返し圧迫や摩擦等の物理的刺激により皮膚の角質が隆起したものです。表面はなめらかか、多少ざらざらしている程度です。押しても痛みがありません。		隆起した部分が取れた時
い ぼ	ウィルス(ヒト乳頭腫ウィルス)の感染によって起こる皮膚の部分的変化です。体のどこにでもできますが、主に手や足の甲、手足の指、膝頭などに好発します。半球状で表面がざらざらして、しばしば群がって生じます。		隆起した部分が取れた時

⚠️【使用上の注意】

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首の回り等)、顔面等。
- (2)炎症又は傷のある患部。


💬相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)乳幼児。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(5)糖尿病の治療を受けている人(糖尿病患者は感染抵抗力が低下しています。角質を取る際に皮膚を傷つけてしまった場合、感染しやすくなります)。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能及び効果】 うおのめ、たこ、いぼ

【形状】



【用法及び用量】

被覆してある剥離紙をはぎとり、中央部のサリチル酸絆創膏が患部を覆うように貼りつけてください。

● 1日毎に交換してください。

特に、ご入浴後の使用は、よりいっそう効果的です。

● 交換の際には白くなった角質部を消毒したピンセットなどで取り除き、引き続き完全に取り切るまで本品の使用を繰り返してください。特に、うおのめはまん中の堅くなった角質の「しん」を完全に取り除かないと再発します。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 目には入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。
- (6) 入浴時には必ず取りはずしてください。

【有効成分及び分量】

膏体100g(1000cm²)中、サリチル酸50gを含む。

添加物として精製ラノリン、ロジンエステルを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。

本品のお問い合わせはお求めのお店又は下記にお願いいたします。

日邦薬品工業株式会社・お客様相談室

「電話：03-3370-7174(代表)」

受付時間・・・9：00～17：00(土、日、祝日を除く)