



日本薬局方 ヨクイニン  
ナカジマ ヨクイニン

第3類医薬品

第3類医薬品

**使用上の注意**

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
定められた用法・用量を守り正しくお使いください

**効能又は効果**

いぼ、皮膚のあれ

**用法及び用量**

大人(15歳以上)は1日量30gを約600mLの水で約400mLになるまで煮詰め、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分けて服用して下さい。

**保管及び取り扱い上の注意**

- ①直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ②小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- ④本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 075-231-2633  
副作用被害救済制度 0120-149-931

**日本薬局方 ヨクイニン  
ナカジマ ヨクイニン**

第3類医薬品

**使用上の注意**

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. 1ヵ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**効能又は効果**

いぼ、皮膚のあれ

**用法及び用量**

大人(15歳以上)は1日量30グラムを、約600mLの水で煮て約400mLになるまで煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分けて服用して下さい。

**保管及び取り扱い上の注意**

- ①直射日光の当たらない所に保管して下さい。
- ②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えなくて下さい。
- ④本品には、防虫、防カビのために脱酸素剤を封入しているのです。これを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 075-231-2633  
副作用被害救済制度 0120-149-931

紙 ラベル

PE, PA

LOT:

副作用被害救済制度 0120-149-931

使用期限

4 936246 100081