

この添付文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【重要・必読】

フェルゼア

手指のあれ・角化症治療薬

尿素20%配合

フェルゼアHA20クリーム

フェルゼアHA20クリームの特長

- フェルゼアHA20クリームは皮膚の水分保持能を高め、硬くなった皮膚をやわらかくしますので、手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、さめ肌に効果的です。
- のびが良く、皮膚によくなじみます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひびわれ)部位。
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬や化粧品等による刺激症状またはアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

(2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

【適応症】

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 本剤は外用にのみ使用すること。
- (4) 小児（15歳未満）には使用させないこと。
- (5) 化粧品ではないので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないこと。

【成分・分量】（1g中）

成 分	分 量	作 用
尿 素	200mg	水分を引き寄せて皮膚をやわらかくします。
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	炎症をやわらげます。
酢酸トコフェロール（ビタミンE）	5mg	皮膚の血行を促進し、乾燥症状を改善します。

添加物として流動パラフィン、セタノール、ステアリン酸、ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘン酸、シリコン油、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、クエン酸Na、水酸化Na、エデト酸Na、パラベン、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (4) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること。

SHISEIDO

お問い合わせ先

資生堂薬品株式会社 お客様窓口 電話 03-3573-6673
受付時間 9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 資生堂薬品株式会社
東京都中央区銀座7-5-5

製造販売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5

FH2-C 05128