

FERZEA® フェルゼア

2015 年 3 月作成

フェルゼアHA20クリーム

第3類医薬品

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

— ① 使用上の注意 —



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜等
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 薬や化粧品等による刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔適応症〕

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

※小児(15歳未満)にはご使用できません。

〔成分・分量〕(1g中)

尿素..... 200mg
グリチルリチン酸二カリウム 5mg
トコフェロール酢酸エステル 5mg
添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリン酸、ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘン酸、シリコン油、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、クエン酸Na、水酸化Na、エドト酸Na、パラベン、その他1成分を含有します。

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではありませんので、適応症で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

〔お問い合わせ先〕

発売元 資生堂薬品株式会社

お客さま窓口 03-3573-6673 受付時間 9:30 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社資生堂 東京都中央区銀座 7-5-5

SHISEIDO