

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

皮ふ軟化薬

モナリアクリーム



第3類医薬品

手肌のカサカサ、ザラザラを取りなめらかにする尿素配合クリーム

◆こんな症状にお使いください

- 手や肌が荒れてカサついたり、ザラザラする方に
- かかとが乾燥して、分厚く、硬くなっているような方へ
- ひじ・ひざ・くるぶしなどが黒ずんでカサカサするような方に
- さめ肌やカサカサ肌、お年寄りの乾燥肌に

上のような症状はドライスキンと呼ばれ、皮ふの角質層の水分が不足して起こります。健康な皮ふでは、皮ふの中の水分がちょうど良い量を保っていますが、不足すると荒れて肌が硬くなり、カサカサ・ザラザラの肌になってしまいます。**モナリアクリーム**に配合されている尿素は、天然保湿成分NMF(Natural Moisturizing Factor)のひとつで、角質の水分を保持する作用、また、古く、硬くなった角質を剥離に導く作用があり、グリチルリチン酸モノアンモニウムは、患部の炎症を修復しながら鎮め、トコフェロール酢酸エステルは末梢の血行を促して、皮ふ表面に十分な酸素・栄養素を供給し、皮ふ表面の新陳代謝が活発になり、すこやかでさらとなめらかな肌にしてくれます。また、基剤にも保湿効果のあるスクワランを配合しておりさっぱりとした使い心地です。水仕事の多い方、乾燥してつらい方は**モナリアクリーム**で早めにお手入れしてください。



＜イメージ図＞

乾燥してあれた皮膚 → なめらかな皮膚へ



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかけ傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ
- (4) 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態。

- (2) 2週間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量

1 日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守って使用してください。化粧品ではないので、効能で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに、水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用のみに使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。

成分・分量

本製品 1.0g中

成 分	分量	は た ら き
尿 素	200mg (20.0%)	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮ふにしっとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになった角質層表面をなめらかにします。
トコフェロール酢酸 エステル	5mg	末梢の血行を促して、皮ふ表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮ふ表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮ふが生まれます。
グリチルリチン酸 モノアンモニウム	5mg	患部の炎症を修復しながら鎮めます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。



本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社

電話 0598-37-2088

受付時間 AM10:00~PM 5:00

(ただし、土、日、祝日を除きます。)

発売元 小林薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142