

生薬製剤

ヨクイニン錠



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----|
| 消化器 | 腹痛 |
| 皮 膚 | 発疹 |

- 3ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

下痢

【成分・分量】 1日量 (12錠) 中

「日局」ヨクイニン末 ……………3000mg

なお、添加物として無水リン酸水素カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、クロスカルメロースナトリウム、パレイシヨデンプン、乳糖を含みます。

【効能・効果】 イボ、皮膚のあれ

【用法・用量】 次の量を食間又は空腹時に温湯にて服用して下さい。 (食間とは、食後2～3時間を指します。)

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|-----------|--------|
| 大人 (15歳以上) | 4錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないで下さい | |

※用法・用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 乾燥剤は薬がなくなるまで捨てないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果にはかわりありませんので安心して服用して下さい。
- ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いて下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地1
電 話：03 (3639) 9771
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

発 売 元 伸 和 製 薬 株 式 有 限 公 司
東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地1



製造販売元 松 浦 薬 業 株 式 有 限 公 司
名古屋市緑区大高町寅新田36