

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 うおの目・たこ・いぼ用薬

新カットコーン NEW CUT CORN

特長

新カットコーンは、サリチル酸を50%配合した、うおの目・たこ・いぼ取り用の医薬品です。

- サリチル酸の角質軟化作用で、うおの目・たこ・いぼを取り除きます。
- ソフトな保護パッドで圧迫による患部の痛みをやわらげます。
- 粘着テープには、皮膚の動きにフィットする伸縮性のある布を使用しています。
- 粘着力がよく、患部をしっかり固定するため、他のテープを使用する必要がありません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目の周囲，粘膜，やわらかい皮膚面(首の周り等)，顔面等
 - (2)炎症又は傷のある患部（症状を悪化させることがあります）
 - (3)水いぼ
 - (4)お年寄りにでしやすい黒褐色の扁平ないぼ
 - (5)外陰部や肛門の周りにできたいぼ
 - (6)群生したいぼ，身体に多発したいぼ
 - (7)かきキズにそって，一列にならんだいぼ

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)乳幼児(皮膚が弱く注意が必要です)
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人(サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を起こす作用が報告されています)
 - (4)糖尿病の治療を受けている人
2. 本剤をいぼにご使用の場合，本剤が有効なのは角質化した表面がザラザラした硬いいぼです。他のいぼについては医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ

4. 本剤を使用しても症状の改善が見られない場合は使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

うおの目，たこ，いぼ

【用法・用量】

患部を押さえるようにして貼り，3～4日毎に取り替えてください。

<用法・用量に関連する注意>

- ①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ②薬剤部分が健康な皮膚に付着すると、その部分も白く軟化し、傷んだりしますので、患部の周りの皮膚につかないようによく注意して使用してください。
- ③はがす時は、皮膚を傷めないようにゆっくりはがしてください。

【成分・分量】膏体1g中 サリチル酸・・・・・・・・・・・・・・500mg (50%)
1枚中

成分	含量	薬剤部分の直径	はたらき
サリチル酸	15mg (Sサイズ)	5mm	角質を軟化させる
	40mg (Mサイズ)	8mm	
	90mg (Lサイズ)	12mm	

膏体部分：添加物としてサラシミツロウ，ポリブテン，ポリオキシエチレンセチルエーテル，その他1成分を含有します。

粘着テープ，粘着剤付フェルト部分：

添加物としてBHT，精製ラノリン，エステルガム，酸化亜鉛，スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体，脂肪族炭化水素樹脂，酸化チタン，その他3成分を含有します。



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】

S・M・Lサイズとも各12枚入

《新カットコーンの上手な使い方（うおの目）》



※入浴などにより患部を軟らかくし、よく拭いてからご使用になると効果的です。

- ① ライナーをはがし，中央の丸い膏体(薬剤部分)を患部にあて，保護パッドをぴったりと貼り，粘着テープで固定してください。
- ② 3～4日間貼り続けてください。入浴などの際も患部を密封するなどして，ぬれないように注意してください。
ぬれた場合は，かわいたタオルなどで，水分を拭き取ってください。ただし，はがれてしまった場合は，交換してください。
- ③ 交換の際には，サリチル酸(角質軟化作用)により白くふやけた角質部を消毒したピンセットなどで痛くない程度に取り除きます。
- ④ 特にうおの目はシンを完全に除去するまで①～③の要領で繰り返してご使用ください。

本商品についてのお問い合わせは，お買い求めの薬局・薬店，又は下記の当社「お客様相談窓口」までお願い申し上げます。

製造販売元  **祐徳薬品工業株式会社**
佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1
【お客様相談窓口】TEL.0954-63-1320
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎0120-149-931