

*2011年3月改訂

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

生薬製剤

本草ヨクイニン錠S

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
しばらく服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

いぼ・皮膚のあれ

用法・用量

次の量を1日3回食間又は食前に水又は温湯にて服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	6錠	3回
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

1日量18錠〔大人の1日服用量〕中、次の成分を含有する。

成分	18錠中
日本薬局方 ヨクイニン末	4,200mg

添加物として、二酸化ケイ素を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電話：052-892-1287（代表）
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

【副作用被害救済制度】電話：0120-149-931

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地

