

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

医薬品
発毛促進薬

カロヤン[®]S

特 徴

カロヤンSは、ふけ、かゆみや脱毛、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛などに効果のある脱毛予防、発毛促進の医薬品です。

カロヤンSは、塩化カルプロニウム、ヒノキチオール、パントテニールエチルエーテル、酢酸トコフェロール(ビタミンE酢酸エステル)などの7種の薬剤を配合し、その協同作用により、ふけ、かゆみを抑え、脱毛予防、発毛促進、育毛に効果を発揮します。

主成分の塩化カルプロニウムは、頭皮から吸収され、頭皮の血管を拡張して血流を増大し毛根の細胞を活性化します。

ヒノキチオールは毛根賦活作用のほかに殺菌作用があり、菌の増殖が原因で起こるふけやかゆみに効果があります。

またカロヤンSには保湿作用があり、薬剤の効果を高めると共に頭皮、毛髪をしっとりさせ、保護します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等のある頭皮。
- (2) 頭皮以外。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合
(使用を中止し、水またはぬるま湯で洗い流すこと)

関係部位	症 状
頭 皮	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	全身性の発汗、それに伴う寒気、ふるえ、吐き気

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、使用を中止し、水またはぬるま湯で洗い流して、医師または薬剤師に相談すること

関係部位	症 状
頭 皮	刺激痛、局所発汗、熱感

効能・効果

- 発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防
- 若禿(壮年性脱毛症)、薄毛
- ふけ、かゆみ
- 病後・産後の脱毛
- 乾癬性脱毛症、円形脱毛症、びまん性脱毛症



若はげ(壮年性脱毛症)



円形脱毛症



抜毛



病後・産後の脱毛



ふけ、かゆみ

用法・用量

1日2～3回、適量を頭髮地肌にすりこみ、軽くマッサージする。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4)液のついた手で、目など粘膜にふれると刺激があるので手についた液は、よく洗い落とすこと。
- (5)頭皮にのみ使用すること。

～効果的にお使いいただくために～

- ①まず洗髪をして頭皮の余分な脂をとります。
- ②つぎに頭皮のほてりをさましてから、カロヤンSをつけ、頭髮地肌によくすりこみます。
- ③最後にマッサージで血行を促し、リラックスしましょう。



シャンプー＆
コンディショナー



乾燥



カロヤンS



マッサージ

- ★洗髪直後や湯あがり直後は発汗しやすいので、ほてりをさましてからつけてください。
- ★1回に大量使うより、適量（1回2～3mL）を毎日根気よく使うほうが効果的です。そのままふりかけるか、脱脂綿あるいはスポンジ等に薬液をしみこませて頭髮地肌にすりこんでください。
※瓶を振って薬液を軽く振り出した場合、液は1回で約0.5mL出ます。4回でほぼ2mLです。
- ★女性の方は、髪を分けて地肌によくすりこんでください。
- ★つけた時、液が軽く泡立ちますが、薬の性質によるもので心配はありません。
- ★マッサージは指先で頭皮を軽くもむようにしてください。爪などできずつけないように、また、先の尖ったクシや金属ブラシは地肌をきずつけるおそれがあるので使用しないでください。ブラシをお使いになる時は、なるべく獣毛のものをお選びください。

成分・分量

100mL中

成 分	分 量
塩化カルプロニウム水和物	1.09g (塩化カルプロニウムとして1g)
ヒノキチオール	0.05g
パントテニールエチルエーテル	1g
酢酸トコフェロール	0.01g
サリチル酸	0.2g
l-メントール	0.3g
塩酸ジフェンヒドラミン	0.1g

添加物として、dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤、黄色5号、香料、エタノールを含有する。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
 - (2)小児の手の届かない所に保管すること。
 - (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 - (4)火気に近づけないこと。
 - (5)アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)には、付着しないようにすること。
 - (6)染毛料をご使用の方は完全に染毛を終え、十分に水で洗ったのち本剤を使用すること。
(すすぎが不完全な場合、まれに衣服を汚すことがある。)
 - (7)本剤の使用期限は容器および外装に記載してあるので、使用期限内に使用すること。
- ※きわめて寒冷(5℃以下)の場所に長期間放置すると、沈殿を生じることがありますが、常温に置けば、もとに戻ります。効果には変わりありません。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03(6667)3232
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

カロヤンについて詳しくは <http://www.karoyan.com/>



Daiichi-Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元

埼玉第一製薬株式会社

埼玉県春日部市南栄町8番地1

® 登録商標