

医薬品

ハツモール・

内服錠

発毛促進剤

特 徴

- 頭髮の脱毛原因は多種多様で、個々の体質によっても異なり、その治療法は色々あります。現在どの症状にも局所療法が行われていますが、原因が千差万別なので外用以外に体内からの治療が必要です。「ハツモール・内服錠」は脱毛症に対して効果のある薬剤の複合体で主成分の薬剤がそれぞれの原因に作用して局所栄養障害を体内より改良し、毛乳頭組織の発毛機能をよみがえらせます。
- 「ハツモール・内服錠」は、粧糠性脱毛症の原因になる血液中の脂質過多を正常にして脱毛部の血行をよくする作用があります。また、精神的なストレスや自律神経障害による脱毛症には内科的な精神安定を補助し、体内より栄養を補給して、皮下組織の栄養を良好にし、発毛しやすい体質にします。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 幼児 (2) 適応症（脱毛症）以外の人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

本剤の使用により、悪心、嘔吐、下痢、腹痛、皮膚の発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合。

効能・効果

靴擦れ性脱毛症、円形脱毛症

用法・用量

成人1日6錠を水またはお湯で2～3回に分けて服用すること。

<用法・用量に関する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 錠剤の取り出し方



図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる）

成分・分量

【6錠（成人の1日の服用量）中】

カンゾウ末	500.202 mg	塩酸チアミン（ビタミンB1）	2.49 mg
イノシトールヘキサニコチネート	480 mg	リボフラビン（ビタミンB2）	0.996 mg
セファランチン	0.015 mg	塩酸ピリドキシン（ビタミンB6）	2.49 mg
酒石酸アリメマジン	0.03 mg	アスコルビン酸（ビタミンC）	12.45 mg
パントテン酸カルシウム	497.298 mg	ニコチン酸アミド	4.98 mg

※添加物として、青色1号、黄色4号を含有する。

保管および取扱い上の注意

1. 小児の手のとどかない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ないところに保管すること。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

包装

60錠（10錠×6）・180錠（10錠×18）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

株式会社 田村治照堂 お客様相談室

住 所：〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 3-6-15

電 話：06-6622-6482

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（祝祭日を除く）

株式会社 田村治照堂

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂3-6-15

<http://www.hatumoru.co.jp>