

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

切り傷、やけどに

医薬品



リトスペール軟膏

外皮用薬

紫根（シコン）は、古くから生薬、染料として用いられ、これを医薬品として利用した例の中でも有名なものには「紫雲膏（しうんこう）」というのがあります。リトスペール軟膏も同様に紫根を用いております。紫根とは読んで字の如し、ムラサキ属の“ムラサキ”という植物の根のことで、赤紫色をしています。これを成分とする本品も同じ色をしています。この色素が紫根中の主成分であるシコニン及びアセチルシコニンであり、皮膚創傷、火傷面の新生や肉芽形成に効果をあらわします。つまり、皮膚自身の治癒力を高めて助ける働きがありますので、切り傷、やけど、しもやけなどの症状を改善してくれます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）本人または家族がアレルギー体質の人。
 - （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （4）患部が広範囲の人。
 - （5）湿潤やただれのひどい人。
 - （6）深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- （1）使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- （2）5～6日間使用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

一般潰瘍、火傷、外科創傷、きれ痔、凍傷

■ 成分・分量 (1,350g中)

紫根	100g	} 抽出油 …………… 950g
大豆油	1,000g	
黄口ウ	……………	400g

生薬を原料として製造していますので、製品の色や固さ等に多少の差異が生じることがあります。

■ 用法・用量

本品を適宜患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 軟膏が冷たくなりすぎるとチューブから出なくなる場合があります。その場合には、温かい場所に移してしばらくしてから使用してください。
- (5) 本剤は日時の経過とともに色調の変化が幾分見られますが、有効成分の効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■ お問い合わせ先

- ご購入された薬局、薬店
- 合名会社 東宝製薬
電話／ (058) 251 - 6668
受付時間／10:00～16:00
(土・日・祝日を除く)

メ モ 購入店など記入してください。