

【浸潤性・潰瘍性皮膚疾患用生薬製剤】

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

ワグラス® W錠

- ◆ ワグラスW錠は、じめついたり、ただれたりした皮膚病を改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ ワグラスW錠中のオウギは皮膚を力づけ、ブクリョウ・ビャクジュツは体内の不要な水分を排出させ、ケイヒ・シャクヤクとともに皮膚のじめつき・ただれなどの皮膚症状の改善をはかります。タイソウ・ショウキョウ・カンゾウは自然治癒力を湧かせて、浸潤性(じめつく)や潰瘍性(ただれる)皮膚病の病状回復を早めるように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

浸潤性(じめつく)及び潰瘍性(ただれる)の皮膚病

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	5錠	3回
15歳未満12歳迄	4～3錠	
12歳未満 7歳迄	3～2錠	
7歳未満 5歳迄	2～1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤7000錠(1400g)中

オ ウ ギ・カ ン ソ ウ
ケ イ ヒ・シ ャ ク ヤ ク
シ ョ ウ キ ョ ウ・タ イ ソ ウ
ビ ャ ク ジ ュ ツ・ブ ク リ ョ ウ

乾燥エキス…175g

カ ン ソ ウ 末……500g
ケ イ ヒ 末……250g
シ ャ ク ヤ ク 末……125g
シ ョ ウ キ ョ ウ 末……100g
ビ ャ ク ジ ュ ツ 末……250g

- ・本剤は淡茶褐色で、味は甘い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

薬と養生

ワグラスW錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1