

強ワグラス®W

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

皮膚掻痒症^{a)}、痒疹^{b)}

a) 皮膚掻痒症：皮膚がかゆい状態を示します。

b) 痒疹：強いかゆみを伴った吹き出物のことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	3回
大 人 (15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	
10歳以上15歳未満	大人の2/3の量 (1.0g)	2/3包	
5歳以上10歳未満	大人の1/2の量 (0.75g)	1/2包	
2歳以上 5歳未満	大人の1/3の量 (0.5g)	1/3包	
1歳以上 2歳未満	大人の1/4の量 (0.375g)	1/4包	
1歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤 4.5g又は3包中

(オウギ 0.179g・トウキ 0.089g) エキス…0.223mL (固形物として 0.027g)

オウギ 0.216g・シヤクヤク 0.36 g・センキュウ 0.144g } エキス…2.88mL
タイソウ 0.173g・トウキ 0.216g・ガイヨウ 0.432g } (固形物として 0.154g)

カンゾウ末…1.44g、ケイヒ末…0.72g、シヤクヤク末…0.36g、
ショウキョウ末…0.36g、ソウジュツ末…0.72g、ブクリョウ末…0.719g

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、
効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、
2日以内に服用すること。

強ワグラスWは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・
薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、
又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1