

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【浸潤性・潰瘍性皮膚疾患用生薬製剤】

強 ワ グ ラ ス W

第2類医薬品

- ◆ 強ワグラスWは、皮膚が弱って保湿力が低下することで起こる皮膚のかゆみを改善するために考え出された11種類の生薬から成る生薬製剤です。
- ◆ 強ワグラスW中のオウギはケイヒ・シャクヤク・トウキ・センキュウ・ガイヨウとともにかゆみを起こす皮膚の状態の改善を図ります。タイソウ・ショウキョウ・カンゾウ・ブクリヨウ・ソウジュツはこのようないくつかの皮膚病の病状回復を手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸の弱い人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
 むくみ
 (7) 次の診断を受けた人。
 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

ひふそうよう
皮膚瘙痒症^{a)}、痒疹^{b)}

a)皮膚瘙痒症：皮膚がかゆい状態を示します。

b)痒疹：強いかゆみを伴った吹き出物のことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
10歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
5歳以上10歳未満	大人の1/2の量(0.75 g)	1/2包	
2歳以上 5歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
1歳以上 2歳未満	大人の1/4の量(0.375g)	1/4包	
1歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

(オウギ 0.179g・トウキ 0.089g)エキス…0.223mL(固形物として0.027g)

オウギ 0.216g・シャクヤク 0.36 g・センキュウ 0.144g } エキス…2.88mL
タイソウ 0.173g・トウキ 0.216g・ガイヨウ 0.432g } (固形物として0.154g)

カンゾウ末…1.44g、ケイヒ末…0.72g、シャクヤク末…0.36 g、
ショウキョウ末…0.36g、ソウジュツ末…0.72g、ブクリヨウ末…0.719g

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強ワグラスWは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号