

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目薬

目の充血・目のつかれに

**強** ゴールドパール®

第2類医薬品

活性型ビタミンB2・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 配合

**強** ゴールドパールは、目の炎症や充血を除き、角膜表層を保護する目薬で、目の充血や目のつかれに良く効きます。

## 【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3)次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
  - (4)次の診断を受けた人。  
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)目のかすみが改善されない場合。
  - (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

## 【効能・効果】

結膜充血、目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ。

## 【用法・用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズ及び酸素透過性ハードコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

### ◎ワンポイントアドバイス◎

- 点眼後にコンタクトレンズを装着するときは、5～10分以降に装着しましょう。
- 本品の1滴は0.03～0.05 mLになります。10 mL入りの本品は約200～300滴分になります。
- 点眼後は目からあふれた液を清潔なガーゼやティッシュ等で拭き、目頭を抑えて1～2分間静かに目を閉じておくのが効果的です。



## 【成分】 (1mL中)

成分	分量	はたらき
フラビンアデニン ジヌクレオチドナトリウム (FAD・2Na: 活性型ビタミンB <sub>2</sub> )	0.5 mg	目の健康回復を助け、眼瞼炎などの炎症を改善します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	5 mg	目にうるおいを与えて目を保護し、目の疲れを和らげます。
ナファゾリン塩酸塩	0.03 mg	結膜の充血除去作用があり、目の充血・腫れを抑えます。

添加物としてエデト酸Na、クエン酸、クエン酸Na、クロロブタノール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、塩化Na、*d*-ボルネオールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)衣服などに付着したときは、直ちに石けん水で洗い落としてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住 所: 〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話: 03 (3946) 3610  
受付時間: 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>