

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《点眼薬》

第2類医薬品

目のかゆみ・結膜充血に アイカフーン

アイカフーンの特長

1. 春の杉花粉や秋のブタクサなどによる花粉症(目のアレルギー反応)による目のかゆみにすぐれた効果を発揮します。
2. 読書、受験勉強、長い時間テレビをみるなど、使いすぎた目をすこやかにします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴点眼してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

裏面もよくご覧ください。

成分・分量

アイカフーンは、無色～微黄色澄明な点眼液で100mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	100mL中	は た ら き
ナファゾリン塩酸塩	3mg	結膜充血を改善します
イブシロンーアミノカプロン酸	1000mg	目の炎症を抑えます
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	目の炎症を抑えます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	目のかゆみや炎症を抑えます
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg	新陳代謝を活発にします

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、クロロブタノール、パラベン、l-メントール、d-ボルネオール及びエタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(ラベルとケースに記載)を過ぎた製品は、使用しないでください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に付くことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7)品質を保持するため温度40℃以上となる場所に置かないでください。自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形することがあります。

包 装

15mL

問い合わせ先

テイカ製薬株式会社 お客様相談係

電話 076(431)8863 [医薬情報部]

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)