

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

目のかゆみ・充血に アイカフーン

目薬

アイカフーンの特徴

アイカフーンは、目のかゆみを抑える成分、充血を改善する成分、炎症を抑える成分および新陳代謝を活発にするビタミン成分を配合し、花粉やハウスダストなどによる目のかゆみ・充血にすぐれた効果を発揮します。目の疲れや眼病予防*にも効果がある、すっきりしたさし心地の目薬です。

※水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果


目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先をまぶた、まつ毛にふれないようにしましょう

裏面もよくご覧ください。

成分とはたらき


無色～微黄色澄明な点眼液で次の成分を含んでいます。

成 分	含有量(100mL中)	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	結膜充血を改善します
イブシロンーアミノカプロン酸	1000mg	目の炎症を改善します
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	目の炎症を改善します
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目の炎症やかゆみを抑えます
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg	目の疲れ等の症状を改善します

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、クロロブタノール、パラベン、l-メントール、d-ボルネオール及びエタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(ラベルとケースに記載)を過ぎた製品は、使用しないでください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に付くことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



お客様相談係

電話番号：076(431)8863〔テイカ製薬(株)〕
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

包 装

15mL

おねがい

品質を保持するため高温下となる所に置かないでください。
自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が劣化することがあります。

