

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

目のかゆみ・結膜充血

第2類医薬品

アイブルーAG

眼科用薬

タウリン 配合

春先、花粉の季節になるとアレルギーで目がかゆいといった症状に悩む人がたくさんいます。

しかし花粉の季節でなくても目のかゆみをうったえる人が近年増えています。こういったアレルギー症状は、スギ花粉などの花粉によるだけでなく、家の中のダニ、ハウスダスト(室内塵)、カビ類、大気汚染によっても起こります。

アイブルーAGは、アレルギー症状である目のかゆみや充血を起こす物質“ヒスタミン”の作用を遮断してかゆみをしずめるとともに、目の不快な症状をやわらげます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

(効能・効果)

目のかゆみ、結膜充血、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

(用法・用量)

1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法、用量を守って使用してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。


(キャップの開閉方法)

キャップの開け方



キャップを左に回して開けてください。

キャップの閉め方



キャップを右に回して閉めてください。

◎必ずキャップを上にして、容器をしっかり持って開けてください。

(正しい点眼方法)

容器の先がまぶたやまつ毛にふれないように点眼してください。



(成分・分量)

成 分	分 量	は た ら き
塩酸テトラヒドロソリン	0.050%	血管収縮作用により、結膜充血などの不快な症状を取り除きます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.050%	アレルギーを引き起こす原因であるヒスタミンの放出を抑制して不快な症状の発現を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.030%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑えます。
タウリン	0.500%	目に栄養を与え、細胞の代謝を促進して、炎症によって損傷した目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.100%	目の粘膜を保護することにより、目の乾燥を防いでくれます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、塩化ナトリウム、パラベン、*l*-メントール、*d*-ボルネオールを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。高温下に放置した製品は、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので使用しないでください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります。)
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに(2ヶ月以内に)使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってから使用してください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話06-6202-8911
受付時間：9:00～17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**

大阪市中央区道修町二丁目5番14号

製造販売元 **キョーリンリメディオ株式会社**

富山県南砺市井波885番地