

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アイラート[®]40

目 薬

第3類医薬品

アイラート40は、低下した目の機能の回復を早め、「かすみ目」、「疲れ目」に効果を発揮する目薬です。

1. 目の調節機能の回復を早めるビタミンB₁₂とネオスチグミンメチル硫酸塩を配合しています。
2. 目の疲れに伴う炎症を鎮めます。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみ改善されない場合。
- (3)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを着用しているときの不快感、目のかゆみ。

【用法・用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。

【成 分】 (10mL中)

シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）…………… 2 mg
酢酸*l*- α -トコフェロール（天然型ビタミンE）…………… 1.5 mg
イプシロン-アミノカプロン酸…………… 100 mg
グリチルリチン酸二カリウム…………… 10 mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩…………… 0.5 mg
L-アスパラギン酸カリウム…………… 50 mg
添加物としてエデト酸Na、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、*l*-メントール、塩化Na、*l*-カンフル、ポビドンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)本品が衣類に付着したときは、直ちに石けん水で洗い落としてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>