

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# アイラート<sup>®</sup>40

目薬

第3類医薬品

販売名：アイラート40

アイラート40は、低下した目の機能の回復を早め、「かすみ目」、「疲れ目」に効果を発揮する目薬です。

1. 目の調節機能の回復を早めるビタミンB<sub>12</sub>とネオスチグミンメチル硫酸塩を配合しています。
2. 目の疲れに伴う炎症を鎮めます。

## 【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
    はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
    緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

## 【効能・効果】

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ。

## 【用法・用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズ及び酸素透過性ハードコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。

### ◎ワンポイントアドバイス◎

○点眼後は目からあふれた液を清潔なガーゼやティッシュ等で拭き、目頭を押さえて1～2分間静かに目を閉じておくのが効果的です。

○点眼後にコンタクトレンズを装着するときは、5～10分以降に装着しましょう。



## 【成 分】 (10mL中)

成 分	分量	はたらき
シアノコバラミン (ビタミンB12)	2mg	毛様体筋に働き、ピント調節機能の回復を早め、かすみ目を改善します。
酢酸 <i>l</i> - $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	1.5mg	脂質の過酸化を防ぎ、末梢血行を改善して、疲れ目を改善します。
イプシロン-アミノカプロン酸	100mg	目の疲れに伴う炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.5mg	毛様体筋に働き、ピント調節機能の回復を早め、かすみ目を改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	50mg	目の細胞の代謝促進作用を有し、疲れ目を改善します。

添加物としてエデト酸Na、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマジ油、ポリソルベート80、*l*-メントール、塩化Na、*d*-カンフル、ポビドンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)本品が衣類に付着したときは、直ちに石けん水で洗い落としてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03 (3946) 3610  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<https://www.zenyaku.co.jp>