

目のかすみ・目の疲れに アイルビー・40E

特徴

アイルビー・40Eは、ビタミンEを配合したさわやかな清涼感のある目薬でかすみ目、疲れ目等に優れた効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人。
緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合

【効能・効果】

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。（レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、レンズの物性に影響を与えることがある。）
- (4) 点眼用にのみ使用すること。



容器の先端が目につかないように注意すること

（裏面につづく）

〔成分・分量〕

100mL中

成 分	含 量	は た ら き
酢酸トコフェロール(V.E)	15mg	毛細血管の血行を促し、目のはたらきを良くします。
メチル硫酸ネオスチグミン	5mg	ピントを調整し、かすみ目や疲れ目を改善します。
コンドロイチン硫酸ナトリウム	100mg	眼組織の機能低下を改善しますので、老化によるかすみ目や疲れ目等に効果をあらわします。
マレイン酸クロルフェニラミン	30mg	目の炎症や充血を取除きます。

添加物として塩化Na、ホウ酸、ホウ砂、パラベン、ポリオキシエチレンソルビタンオレエート、 ℓ -メントール、 d -ボルネオール、エタノールを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 使用後はキャップをしっかりとめて、添付の携帯袋に入れ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 他の人と共用しないこと。(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。



直射日光

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛 津 製 薬 株 式 会 社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2