

結膜充血・眼病予防

アイルビーAL

特徴

アイルビーALは、消炎酵素剤リゾチーム塩酸塩に結膜充血除去剤塩酸テトラヒドロゾリン等を配合した目薬で、炎症からくる目のかゆみ、目の充血に優れた効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）医師の治療を受けている人。

（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

（3）次の症状のある人。

はげしい目の痛み

（4）次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）目のかすみが改善されない場合。

（2）5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

〔効能・効果〕

結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

（裏面につづく）

〔用法・用量〕

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがある。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。
また、混濁したものは使用しないこと。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
(レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、
レンズの物性に影響を与えることがある。)
- (5) 点眼用에만使用すること。



〔成分・分量〕

100mL中

容器の先端が目につかない
ように注意すること

成 分	含 量	は た ら き
リゾチーム塩酸塩	500mg(力価)	抗炎症消炎作用
塩酸テトラヒドロゾリン	20mg	血管収縮作用
アラントイン	100mg	抗炎症作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用

添加物として塩化Na、ホウ酸、ホウ砂、パラベン、エデト酸ナトリウム水和物、*d*-ボルネオール、*l*-メントール、エタノールを含みます。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 他の人と共用しないこと。(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用すること。



直射日光

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2