

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

目のつかれ・かすみ・充血に

アウゲFX 目薬 15mL

アウゲFXは、テレビ、OA機器、パソコン、ワープロ、ドライブ、スポーツ、仕事等による眼のつかれ・かすみ・充血を解消し、爽やかな清涼感を与えてくれる、現代生活にマッチした、ツイストキャップを装備した目薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

 はげしい目の痛み

- (5) 次の診断を受けた人。

 緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

(効能・効果)

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

●目を酷使するこんな方におすすめします。



(用法・用量)

1日5~6回、1回2~3滴ずつ点眼してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くこともありますので、定められた用法・用量をよくお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

容器の先が、まぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので、ご注意ください。また、混濁したものは、ご使用にならないでください。

(4)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

(5)ソフトコンタクトレンズを装着したままご使用にならないでください。

(6)本剤は、点眼用にのみご使用ください。

(キャップの開閉方法)

キャップの あけ方

キャップを手前にひねってください。



キャップの しめ方

カチッと音がするまで押し下げてください。



(正しい点眼方法)

中栓が目やまつ毛にふれないように点眼してください。



(成分・分量)

成 分 ・ 分 量	配 合 成 分 の 働 き
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム（等量混合物） 2.000%	目の細胞の呼吸を盛んにして、弱った目の機能を回復します。
アラントイン 0.300%	結膜の炎症をしづめ、目に生じた傷やただれを治す作用があります。
メチル硫酸ネオスチグミン 0.001%	目の調節機能を活発にし、目の疲れを回復させる働きをします。
塩酸ナファゾリン 0.003%	血管を収縮させ、目の充血を除去します。
マレイン酸クロルフェニラミン 0.020%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみを抑えます。
添加物として、ホウ酸、ハッカ油、l-メントール、ゲラニオール、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、ポリソルベート80を含有する。	



(保管及び取り扱い上の注意)

(1)使用後はキャップをしっかりと締めて、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。

(2)小児の手の届かないところに保管してください。

(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

(4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。

(5)使用期限（外箱に書いてあります）の過ぎたものは、ご使用にならないでください。

(6)開封後はなるべく早く（2ヶ月以内に）使用してください。



(お客様相談窓口)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

東洋ファルマー株式会社 学術部

〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

電話番号 076-239-2270

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）