

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

目薬
つかれ目・充血に
アスパライトD[®]

第2類医薬品

私達の目は毎日テレビ、読書、夜ふかしなどで疲れ、その他ホコリやスモッグ、強い光などの刺激のためにいろいろな目の病気を起こしがちです。
この様な時、角膜、結膜に作用する成分を中心に処方されたアスパライトDを点眼しますと、効果的に作用して、疲れ目、充血、炎症をいやし、眼病予防にすぐれたききめをあらわします。そしてまた、さわやかな清涼感とうるおいを与え、機能の回復を早めます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やに多いときなど）

用法・用量

1回2～3滴、1日3～4回 点眼して下さい。

（裏面もお読み下さい）

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量(100mL中)

L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム（等量混合物）	1000mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
グリチルリチン酸二カリウム	100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg
ナファゾリン塩酸塩	3mg
アラントイン	100mg
添加物としてクロロブタノール、パラベン、ホウ酸、 <i>l</i> -メントール、 <i>d</i> -ボルネオール、ホウ砂を含有する。	

＜成分に関連する注意＞

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
 - (4)他の人と共用しないで下さい。
 - (5)表示の期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。
- *自動車の中や暖房器具の近く等、高温（40℃以上）の所に置かないで下さい。（容器が変形することがあります）

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電話 (076) 475-2121

受付時間 8:10～16:40（土、日、祝日を除く）



製造販売元
中新薬業株式会社
富山県滑川市上小泉 504-2