

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

目のかゆみ、目の充血に エゼット®A

〔特 徴〕

- アズレンスルホン酸ナトリウムは、非ステロイド性抗炎症剤として開発された薬剤で、花粉等によるアレルギー性・炎症性の眼疾患に効果をあらわします。
- イプシロン-アミノカプロン酸、マレイン酸クロルフェニラミンのもつ抗炎症・抗アレルギー作用で、目の充血をとり、炎症をしずめ、かゆみを抑えて、不快な症状を改善します。
- コンドロイチン硫酸ナトリウムは、角膜細胞に働いて、目の生理機能の回復をたずけます。また、組織を保護・修復する作用は、角膜表層を保護して諸症状の改善を促進させます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2)目のかすみが改善されない場合

(3)2週間位使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

（必ず裏面もお読みください）

＜用法や用量に関する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法、用量を守ってください。
- (6)液色は、成分の色です。誤って衣服等に付着した場合には、水で洗い落としてください。

〔成分〕

成 分	分 量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.02%	目のかゆみ・目の充血をとり除きます。
マレイン酸クロルフェニラミン	0.01%	
イブシロン-アミノカブロン酸	3.00%	
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.10%	弱った目の機能を回復し、角膜を保護します。

添加物として、ホウ酸、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びpH調整剤を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)成分のアズレンは光線によって変化しやすい性質を有していますので、使用後は遮光袋に入れて保存してください。
- (6)品質保持のため脱酸素剤が入っています。点眼薬をビニール袋から取り出した際には脱酸素剤を捨ててください。
- (7)外箱に表示の使用期限内に使用し、使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (8)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町 10-11

