

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

目のかゆみ・結膜充血に 第2類医薬品

目薬

オプターナ[®]ピュア

製品の特徴

オプターナピュアは、2種類の抗炎症・抗アレルギー剤配合により、かゆみ・充血などの不快な症状を改善し、さらに冷たいさしごちがスッキリ感を与える点眼薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛、眼に直接触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にはのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成 分	分 量 (100mL中)	は た ら き
イブシロン-アミノ カブロン酸	1,000mg	抗炎症・抗アレルギー作用により目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎などの諸症状を改善します。
グリチルリチン酸 二カリウム	100mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをおさえます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により目の充血を取り除きます。
ネオスチグミン メチル硫酸塩	2mg	目の調節を支配する神経に直接作用して、疲れ目を回復します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	目の代謝機能を活発にして、疲れ目などの症状の回復を早めます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	100mg	角膜を保護し、目の生理機能を回復します。

添加物として、ホウ酸、パラベン、ℓ-メントール、ホウ砂、クロロブタノール、チオ硫酸Na水和物、d-ボルネオールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



ワンポイント情報

近年、花粉やハウスダストなどが原因で起こる目のかゆみ、充血などのアレルギー症状で悩んでいる人が増えています。花粉やハウスダストを完全にシャットアウトすることは困難ですが、外出時のマスクやメガネの着用、毎日の掃除等の日常生活を通じて原因を寄せつけないようにしましょう。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>



製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10