

2011年11月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

目の疲れ・目のかすみに

第2類医薬品

オプターナ[®]目薬

製品の特徴

オプターナ目薬は、目の代謝機能を活性化することにより、目の疲れ・目のかすみなどの不快な症状を改善し、さらに冷たいさしごちがスッキリ感を与える点眼薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い
3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成分	分量 (100mL中)	はたらき
タウリン	100mg	目の新陳代謝を盛んにし、目の不快な諸症状の回復を早めます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	70mg	角膜を保護し、目の生理機能を回復します。
グリチルリチン酸 二カリウム	100mg	抗炎症・抗アレルギー作用により目のかゆみ・充血などをおさえます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により目の充血を取り除きます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをおさえます。

添加物として、ホウ酸、濃ベンザルコニウム塩化物液50、l-メントール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ホウ砂、d-ボルネオールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●ワンポイント情報



インターネットやテレビ、読書など、私たちは常に目が疲れやすい環境で過ごしています。また、高齢化社会にあって加齢に伴う目の疲れや目のかすみを訴える人が増えています。長時間にわたる目の酷使を避け、目にも適度な休息を与えるとともに、大切な目を守るために年に一度の定期検査を受けましょう。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎ 03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）

販売元
湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元
TOA 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10