

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬

Smile[®]_A

第2類医薬品

さわやかな さし心地の目薬

スマイルA

疲れ目・充血に

「スマイルA」はさわやかなさし心地の目薬です。家にいれば、テレビや読書、そして一步外に出れば、スモッグや車の運転…と、毎日の生活の中で、目は知らず知らずのうちに酷使されがちです。こんな時は適度の休養と、目の健康を保つ目薬が有効です。目が疲れたり、充血したり…そんな時は「スマイルA」をお使いください。「スマイルA」は主薬に、目の新陳代謝を促進するL-アスパラギン酸カリウムを配合。疲れ目や充血にすぐれた効果をあらわします。また、点眼すると目にさわやかな清涼感がひろがります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い |

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 目のかすみ改善されない場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

必ず裏面もお読みください

● 効能

目の疲れ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

● 成分(100mL中)

| 有効成分 | 含量 |
|---------------|--------|
| L-アスパラギン酸カリウム | 1.0g |
| アラントイン | 0.1g |
| ナファゾリン塩酸塩 | 0.003g |

* 添加物として、ホウ酸、クエン酸、クエン酸Na、プロピレングリコール、クロロブタノール、*d*-ボルネオール、*l*-メントールを含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

■ お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター(0120-813-752)
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7
1212 1BB