

この添付文書は、本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品

目薬

目のつかれ、目のかすみに

バラードE50

ビタミンE・イプシロン-アミノカプロン酸配合

バラードE50は、天然型ビタミンEを配合した目薬で、目に栄養を補給し、衰えた目の機能を回復させます。働き盛りの方や目を酷使する仕事をされている方に起こりがちな「目のつかれ」、「目のかすみ」等の症状に効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

成分・分量

成 分	分 量 (100mL中)	は た ら き
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg	血行促進作用により、目の疲れを改善します。
イプシロン-アミノカプロン酸	1000mg	抗アレルギー作用・抗炎症作用により、紫外線による眼炎や眼瞼炎の炎症を鎮め、目のかゆみを抑えます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	角膜の乾燥を防止し、目にうるおいを保ちます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	3mg	毛様体筋に作用し、目の調節機能を高め、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・炎症を抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、目の充血を改善します。

添加物として、ホウ酸、クエン酸水和物、パラベン、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、l-メントールを含有します。

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化している恐れがありますので、使用しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 保存の状態によっては、容器の点眼口周囲やキャップの内側に成分の白い結晶がつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽く拭きとって使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10