

使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

点眼薬

ほこり・花粉などによる目のかゆみ・結膜充血に

フジスマイル[®]AG「目薬」

15mL

◆**フジスマイルAG**は、スッキリしたさしごちで、ほこりや花粉などによる目のかゆみ、結膜充血などの目のアレルギー症状に優れた効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
激しい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人
緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

裏面もお読みください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量 100mL中

成 分	含 量	は た ら き
ナファゾリン塩酸塩	3 mg	結膜の血管を収縮させ、目の充血を取り除きます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30 mg	目のかゆみや充血などの不快なアレルギー症状をやわらげます。
グリチルリチン酸二カリウム	250 mg	目の炎症をしずめ、不快な症状をやわらげます。
タウリン	500 mg	角膜を保護し、新陳代謝を高めます。

添加剤：ホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物、*l*-メントール、*d*-ボルネオール 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。)
- (6) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また配置期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。

お問い合わせ先 株式会社富士薬品(学術室)
電話(048)648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地