

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品



目薬

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®
"リセ"したい時、簡単、確実にアイケアできて、
とっても便利です。



"自由な角度で点眼OK!"

キャップの開閉方法

キャップの開け方

キャップを手前に
ひねってください。

キャップの閉め方

カチッと音がするまで
押し下げてください。



※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。
容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもらえる
ことがあります。



⚠使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は
薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状が現われた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

(2) 目のかすみが改善されない場合

(3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

結膜充血、目のかゆみ、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。



用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、
かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕また、
混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用
しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛が
ふれることの
ないように

成分

塩酸テトラヒドロゾリン … 0.04%	硫酸亜鉛水和物 …… 0.1%
ビタミンB ₁₂ …… 0.006%	クロルフェニラミンマレイン酸塩 … 0.01%
ビタミンB ₆ …… 0.05%	L-アスパラギン酸カリウム …… 1%

※ 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-カンフル、ベルガモット油、ゲラニオール、ヒプロメロース、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)
に放置しないでください。
- ※ 有効成分のビタミンB₁₂(ピンク色)は光にあたると分解して退色します。
使用後は必ずキャップをしっかりと閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないよう
にして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内
であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1～2ヶ月を目
安にご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくこと
があります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: **03-5442-6020** 大阪: **06-6758-1230**

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)