

目 薬

目のつかれ・充血・かゆみ・眼病予防

新アスパライトフレッシュ

第3類医薬品

新アスパライトフレッシュは、目の疲れをとり、機能の回復を早めるネオスチグミンメチル硫酸塩、ピリドキシリン塩酸塩、タウリンをはじめとし、目の炎症を鎮め、かゆみ等を抑えるイブシロン-アミノカプロン酸、クロルフェニラミンマレイン酸塩及び目の表面の乾燥を防ぐはたらきのあるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合した、スキッとした清涼感のある目薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼腺炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴 点眼して下さい。

裏面もお読み下さい

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量 100mL中

ネオスチグミンメチル硫酸塩……………5mg	ピリドキシン塩酸塩……………100mg
イブシロン-アミノカプロン酸……………1000mg	タウリン……………1000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………30mg	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………100mg

添加物としてクロロブタノール、パラベン、エデト酸Na水和物、D-マンニトール、l-メントール、d-ボルネオール、ホウ酸、塩化Na、エタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
 - (4) 他の人と共用しないで下さい。
 - (5) 表示の期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。
- ※ 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。（容器が変形することがあります）

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部

電 話 (076) 475-2121

受付時間 8:10～16:40（土、日、祝日を除く）