

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。  
また、必要な時にお読みになれるよう大切に保管してください。

疲れ目・かすみ目・  
結膜充血に

# 新黄珠目薬

第3類医薬品

生薬由来成分

ベルベリン硫酸塩水和物 配合  
グリチルリチン酸二カリウム

15mL

「新黄珠目薬」には古来から漢方処方では消炎の目的で用いられてきたベルベリンとグリチルリチン酸の二つの生薬由来成分が含まれています。その他、アレルギー症状を緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩や角膜保護成分のコンドロイチン硫酸エステルナトリウム、更には新陳代謝を促進するビタミンB<sub>6</sub>を配合しており、疲れ目、かすみ目を改善し、充血やかゆみ等の症状をやわらげ、眼病予防にも効果のある複合型点眼薬です。



## 【使用上の注意】



### 相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療をうけている人。
  - 薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人。  
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 目のかすみ改善されない場合
  - 2週間位使用しても症状がよくならない場合

## 【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼腺炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）。

用法・用量、成分、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧下さい。

## 【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズの装着液として、またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。ソフトコンタクトレンズが変質することがあります。
- (4) 本剤は、点眼用에만使用してください。

## 【成分・分量】

有効成分	含有量(100mL中)	はたらき
ベルベリン硫酸塩水和物	10 mg	ふたつの成分の相乗効果により、炎症による目のかゆみ、充血などの症状を改善します。
グリチルリチン酸二カルウム	150 mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30 mg	ヒスタミンの働きを抑え、目のかゆみを鎮めます。
ピリドキシン塩酸塩	50 mg	細胞の新陳代謝を促進し、疲れ目を改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250 mg	角膜を保護し、目にうるおいをあたえるとともに、眼組織の働きを活性化させ、目の疲れを改善します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、クロロブタノール、メチルパラベン、プロピルパラベンを含有しています。

## 【成分・分量に関連する注意】

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これらは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カルウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

## 【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。点眼の際、衣服などにつけないよう、十分にご注意ください。点眼される際には、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってからご使用ください。

### お問い合わせ先



株式会社 **サキワ漢方薬** お客様相談窓口

住 所：埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1

電 話：048-687-4455

受付時間：午前 9:00～午後 5:00 (土、日、祝日を除く)

発 売 元



株式会社 **サキワ漢方薬**

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1

製造販売元

**佐賀製薬株式会社**

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481

Y-11LA