

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときにはすぐ読めるよう大切に保管してください。

ものもらい・結膜炎に 眼科薬 マリンアイ抗菌S

第2類医薬品
10mL

結膜炎



ものもらい



まぶたのただれ



● サルファ剤(スルファメトキサゾールナトリウム)配合

結膜炎やものもらいの原因であるブドウ球菌などの細菌に優れた抗菌作用を示します。

● 2つの抗炎症剤(イブプロフェン・アミノカブロン酸, グリチルリチン酸二カリウム)配合

2つの抗炎症剤が細菌等による目のかゆみ、痛み、はれなどの症状を鎮めます。

● タウリン配合

目に栄養を与え細胞感染により傷ついた目の組織修復に役立ちます。

● 防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン類)無添加

薬物アレルギーや角膜上皮細胞に障害を与える危険性があるといわれている防腐剤を含んでいません。



【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人：はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 3~4日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

結膜炎(はやり目), ものもらい, 眼瞼炎(まぶたのただれ), 目のかゆみ

〈「ものもらい」についての注意〉

まぶたをこすったり, その他, 目に刺激を加えないように注意してください。 (なお, ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが, 過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので, 過労をさけ, 睡眠を十分とするよう心がけてください)

用法・用量

1回2~3滴, 1日3~6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が, まぶたやまつ毛などに触れると, 目やにや雑菌などのため, 薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また, 混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤は, 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量(1mL中)

スルファメトキサゾールナトリウム 40mg	イプシロン-アミノカプロン酸 10mg
グリチルリチン酸二カリウム 2mg	タウリン 2mg
添加物としてホウ酸, ホウ砂, チオ硫酸Na水和物, エデト酸Na水和物を含有します。			

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後, とき口の中に苦味または甘味を感じることがあります。これは成分であるスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通じて口の中に流れ出てくることによるもので, 品質などの異常によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等, 高温下に放置すると, 容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり, 品質が変わる) .
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限 (外箱に記載) を過ぎた製品は使用しないでください。また, 使用期限内であっても, 開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては, 成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとてから使用してください。

環境問題に配慮し, 携帯袋は採用しておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは, お買い求めの薬局・薬店, 又は下記までお願い申し上げます。

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口 電話: 0942-92-5656

受付時間: 午前9:00~午後5:00 (土, 日, 祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481