

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保存して下さい。

抗菌性点眼薬

ものもらい・はやり目・ただれ目

新サルファ・ルビー

特徴

新サルファ・ルビーは、抗菌剤スルフィソメゾールナトリウム及び目の抗炎症作用のあるグリチルリチン酸ジカリウムの成分により、細菌性眼疾患等に優れた効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

- (2) 3～4日間使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

ものもらい、結膜炎（はやり目）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）

※「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意して下さい。（なお、ものもらいは、体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下している時に起こりやすいので、疲労をさけ、睡眠を十分にとるよう心掛けて下さい。）

〈眼病の説明〉

眼 病	目 の 症 状
も の ら い	まつ毛の根もとやその付近に細菌が感染して炎症を起こしたものです。まぶたが赤くはれて、かゆみを伴います。
結 膜 炎 (はやり目)	プール等で感染するケースが多く、結膜（白目、まぶたの裏）が充血して、かゆみを伴います。
眼 瞼 炎 (まぶたのただれ)	細菌感染等により、まぶたのふちのはれやただれ、かゆみ等の症状があらわれます。

(裏面につづく)

〔用法・用量〕

1回2～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
(レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、レンズの物性に影響を与えることがある。)
- (4) 点眼用にのみ使用すること。



〔成分・分量〕

100mL中

成 分	含 量	は た ら き
スルフィソメゾールナトリウム	4,000mg	持続性サルファ剤で、病原菌に対して強い抗菌力を示します。
グリチルリチン酸ジカリウム	100mg	生薬甘草由来の成分で、結膜炎(はやり目)等の目の炎症を抑えます。

容器の先端が目につかないように注意すること

添加物としてチオ硫酸Na、ホウ酸、ホウ砂、バラベンを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のスルフィソメゾールナトリウム及びグリチルリチン酸ジカリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質等の異常によるものではありません。



直射日光

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 使用後は、キャップをしっかりとめて、添付の携帯袋に入れ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 他の人と共用しないこと。(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。そのような場合は、清潔なガーゼで軽くふき取って使用して下さい。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2