

## ものもらい・はやり目・ただれ目

**新サルファ・ルビー**

## 特徴

**新サルファ・ルビー**は、抗菌剤スルファメトキサゾールナトリウム及び目の抗炎症作用のあるグリチルリチン酸二カリウムの成分により、細菌性眼疾患等に優れた効果をあらわします。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないこと



## 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
    はげしい目の痛み

## 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

## 3. 3～4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 〔効能・効果〕

ものもらい、結膜炎（はやり目）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）

## ※「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。（なお、ものもらいは、体质的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下している時に起こりやすいので、疲労をさけ、睡眠を十分にとるよう心掛けてください。）

## 〈眼病の説明〉

眼 病	目 の 症 状
ものもらい	まつ毛の根もとやその付近に細菌が感染して炎症を起こしたもので、まぶたが赤くはれて、かゆみを伴います。
結 膜 炎 (はやり目)	プール等で感染するケースが多く、結膜（白目、まぶたの裏）が充血して、かゆみを伴います。
眼 瞼 炎 (まぶたのただれ)	細菌感染等により、まぶたのふちのはれやただれ、かゆみ等の症状があらわれます。

(裏面につづく)

## 〔用法・用量〕

1回2~3滴、1日3~6回点眼してください。

## 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、  
混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。  
(レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、  
レンズの物性に影響を与えることがある。)
- (4) 点眼用にのみ使用すること。



## 〔成分・分量〕

100mL中

容器の先端が目にふれない  
ように注意すること

成 分	含 量	は た ら き
スルファメトキサゾールナトリウム	4,000mg	持続性サルファ剤で、病原菌に対して 強い抗菌力を示します。
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	生薬甘草由来の成分で、結膜炎(はやり 目)等の目の炎症を抑えます。

添加物としてチオ硫酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、パラベンを含有  
します。

## 〔成分・分量に関連する注意〕

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じことがあります。こ  
れは成分のスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリ  
チン酸二カリウムが、涙道を通って口中に流れ出てくることによ  
るもので、品質等の異常によるものではありません。



## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。  
特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容  
器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 他の人と共用しないこと。(目の病気にかかっている人が使用している目薬を  
他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開  
栓後は、用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことが  
あります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとて使用すること。

## お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点が  
ございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますよう  
お願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)  
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社  
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2