

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

抗菌性点眼薬

ものもらい・はやり目・ただれ目

# 新サルファ・ルビー

特徴

新サルファ・ルビーは、抗菌剤スルファメトキサゾールナトリウム及び目の抗炎症作用のあるグリチルリチン酸二カリウムの成分により、細菌性眼疾患等に優れた効果をあらわします。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

＊1.次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.長期連用しないこと



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。はげしい目の痛み
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

＊まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

- 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

ものもらい、結膜炎（はやり目）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）

### ＊「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。（なお、ものもらいは、体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下している時に起こりやすいので、疲労をさけ、睡眠を十分にとるよう心掛けてください。）

## （眼病の説明）

眼 病	目 の 症 状
ものもらい	まつ毛の根もとやその付近に細菌が感染して炎症を起こしたものです。まぶたが赤くはれて、かゆみを伴います。

(裏面につづく)

結膜炎 (はやり目)	プール等で感染するケースが多く、結膜(白目、まぶたの裏)が充血して、かゆみを伴います。
眼瞼炎 (まぶたのただれ)	細菌感染等により、まぶたのふちのはれやただれ、かゆみ等の症状があらわれます。

### 〔用法・用量〕

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと  
(レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、レンズの物性に影響を与えることがある。)
- (4) 点眼用のみ使用すること。



容器の先端が目にくれないように注意すること

### 〔成分・分量〕


100mL中

成分	含量	はたらき
スルファメトキサゾールナトリウム	4,000mg	持続性サルファ剤で、病原菌に対して強い抗菌力を示します。
グリチルリチン酸ニカリウム	100mg	生薬甘草由来の成分で、結膜炎(はやり目)等の目の炎症を抑えます。

添加物としてチオ硫酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、パラベンを含有します。

### 〔成分・分量に関連する注意〕

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸ニカリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質等の異常によるものではありません。



直射日光

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 他人と共用しないこと(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用すること。

### お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)  
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社 製造販売元 牛津製薬株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2