

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



コンタクトレンズ使用時の目の不快感・目のかわきに

アイリスCL-Iネオ <目薬>



パソコン使用時などのドライアイ(目のかわき)、目のつかれに

◆アイリスCL-Iネオは、タウリンを配合した涙液型目薬です。

コンタクトレンズ

したまま点眼

コンタクトレンズに吸着して蓄積され、変性の原因となる成分を配合していません。

だから、ソフト、ディスポーザブルをはじめO₂、ハードコンタクトレンズを装着したまま、安心して点眼でき、コンタクトレンズをした目をやさしくいたします。

ドライアイ点眼

(目のかわき)

乾いた目への刺激やトラブルの一因と言われている防腐剤を配合せず、涙の成分(塩化ナトリウム、塩化カリウム)にタウリンを配合。だから、乾いた目にうるおいと栄養を与え、パソコン使用時などのドライアイ(目のかわき)、目のつかれをやさしく改善します。



使用上の注意



相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (5) 次の診断を受けた人。

緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合。
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

効 能


ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

【使い方】

①無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。



②1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。(1本で両目に点眼できます)



③容器には、薬液が押し出しやすいように、やや多く入っていますが、一度開封したものは、液が残っていても必ず捨ててください。



プラスチックとして分別してください。

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。
- (4) 点眼用のみ使用してください。
- (5) 無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- (6) 本剤は「一回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。



容器の先で目を傷つけないように注意してください。

成 分

成 分	分 量	はたらき
アミノエチルスルホン酸 (タウリン)	1.0%	目に栄養を与え、目のつかれをやわらげます。
塩化ナトリウム	0.56%	涙の成分であり、涙不足をおぎない、目にうるおいを与えます。
塩化カリウム	0.113%	

添加物：炭酸水素Na、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6) ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元
ファーマパック株式会社
富山県富山市中小163番地