

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保存して下さい。

点 眼 薬
(人工涙液型)

目のかわき・目の疲れ

アイルビークール

特徴

アイルビークールは、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物の無機塩類を配合した人工涙液に、角膜乾燥防止作用をもつコンドロイチン硫酸エステルナトリウムをプラスした目薬です。涙液不足による目のかわき、目の疲れに優れた効果をあらわします。

● 涙液の不足している人はこんな方々です ●



・長時間の運転



・長時間の読書



・OA機器をよく使用する



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。
緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

- 目のかすみ改善されない場合
- 2週間位使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

涙液の補助（目のかわき）、目の疲れ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

（裏面につづく）

〔用法・用量〕

1回2～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
(レンズに薬剤が徐々に吸着されて、目に刺激を与えたり、レンズの物性に影響を与えることがある。)
- (4) 点眼用にはのみ使用すること。



容器の先端が目につれないように注意すること

〔成分・分量〕

100mL中

成 分	含 量	は た ら き
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム (コンドロイチン硫酸ナトリウム)	500mg	角膜乾燥防止のはたらき
塩化ナトリウム	500mg	無機塩類
塩化カリウム	150mg	
塩化カルシウム水和物(塩化カルシウム)	15mg	

添加物としてホウ酸、ホウ砂、パラベン、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、エタノールを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 使用後は、キャップをしっかりとめて、添付の携帯袋に入れ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。特に車のダッシュボード等、高温下に放置したものは、容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になり品質が変わる。)
- (4) 他の人と共用しないこと。(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがある。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は、用法・用量を守り、できるだけ速やかに使用すること。



直射日光

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電 話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2