

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鼻炎用内服薬

第2類医薬品

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり

アスゲン[®]鼻炎錠S

アスゲン鼻炎錠Sは、スギ・ヒノキの花粉やハウスダストなどが原因のアレルギー性鼻炎や急性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった不快な鼻炎症状にすぐれた効果をあらわします。本剤は5歳のお子様から大人まで服用していただける錠剤です。



【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）
- 3.長期連用しないでください



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難、むくみ
 - (6)次の診断を受けた人。緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください：口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	成人(15歳以上)	11歳以上 15歳未満	5歳以上 11歳未満	5歳未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方（P T P品）

右図のように錠剤の入っているP T Pシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



〔成分・分量〕


白色の錠剤で、9錠（成人1日服用量：2.25g）中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9 mg
フェニレフリン塩酸塩	30 mg
ペラドンナ総アルカロイド	0.45 mg
グリチルリチン酸	45 mg
無水カフェイン	120 mg

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mgを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。（ピン入品）
- (5)ピンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。（ピン入品）
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 03-3370-7174(代表)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 アスケン製薬株式会社
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008