

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎などのくしゃみ・鼻みす・鼻づまりに

**エスタック<sup>®</sup> 鼻炎 ソフトニスキップ<sup>®</sup>**

有効成分がすでに透明な液体ですから、のめば鼻が心地よく通ります。

**S.TAC RHINITIS SOFT NYSCAPS**

エスタック鼻炎ソフトニスキップは、鼻かぜなどの急性鼻炎や花粉症などのアレルギー性鼻炎の諸症状によく効く、ソフトカプセル剤です。カプセルの中で有効成分がすでに透明な液体となって溶けており、くしゃみ・鼻みす・鼻づまりなどの症状にすぐれた効果をあらわします。

**⚠ 使用上の注意****ⓧ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

3. 長期連用しないでください

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

(2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

**■ 効能・効果**

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みす、鼻づまり、なみだ目、頭重、のどの痛み

●くしゃみ



●鼻みす



●鼻づまり



®：登録商標

## 用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用します。

年齢	大人(15才以上)	15才未満
1回量	1カプセル	服用しないこと

<用法・用量に関する注意>(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)

## 成分と作用

成分	3カプセル中	作用
d-マレイン酸 クロルフェニラミン	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりといったアレルギー症状をやわらげます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.6mg	鼻みず・涙液の過剰な分泌をおさえます。
塩酸フェニレフリン	15mg	鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりに効果をあらわします。

添加物として、ゼラチン、D-ソルビトール、ポビドン、マクロゴール、グリセリン、青色1号を含有します。

## 日常生活では…

●できるだけ、アレルギーを起こす物質をさけるようしましょう。



●室内、寝具類の清潔を心がけましょう。



●栄養・睡眠を十分にとるようにしましょう。



## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)開封後は湿気をおびやすいので、アルミ袋の切り口を折り返して保管してください。(5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒107-8589 東京都港区赤坂4-2-6

<http://www.ssp.co.jp/>

1-6AL