

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

エスタック[®]鼻炎ソフトニスキャップ 第2類医薬品

鼻炎薬 急性鼻炎・アレルギー性鼻炎などのくしゃみ・鼻みず・鼻づまりに

- エスタック鼻炎ソフトニスキャップは、カプセルの中で有効成分がすでに透明な液体となって溶けており、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどの症状にすぐれた効果をあらわします。
- エスタック鼻炎ソフトニスキャップは、鼻かぜなどの急性鼻炎や花粉などによるアレルギー性鼻炎の諸症状によく効く、ソフトカプセル剤です。

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ③ 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- ④ 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、頭重、のどの痛み

用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1カプセル	× 服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)

成分と作用

成 分	3カプセル中	作 用
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりといったアレルギー症状をやわらげます。
ペラドンナ 総アルカロイド	0.6mg	鼻みず・涙液の過剰な分泌をおさえます。
フェニレフリン塩酸塩	15mg	鼻粘膜の充血・はれをおさえ、鼻づまりに効果をあらわします。

添加物：ゼラチン、D-ソルビトール、ポビドン、マクロゴール、グリセリン、青色1号

日常生活では・・・

- できるだけ、アレルギーを起こす物質をさけるようにしましょう。
- 室内、寝具類の清潔を心がけましょう。
- 栄養・睡眠を十分にとるようにしましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)開封後は湿気をおびやすいので、アルミ袋の切り口を折り返して保管してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>