

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ジキニン[®] 鼻炎AG 顆粒

鼻炎用内服薬

第2類医薬品

ジキニン鼻炎AG顆粒は、生薬ペラドンナの抽出成分ペラドリン20などの働きにより、花粉、ハウスダスト、ダニなどが原因で起こるアレルギー性鼻炎や、急性鼻炎による くしゃみ、鼻みず、鼻づまりにすぐれた効き目を発揮します。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）

4. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
- (7)次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (8)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき、便秘

【効能・効果】

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い。

【用法・用量】

次の量を4時間以上の間隔を置いて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1 包	3 回
11才以上 15才未満	2/3包	
7才以上 11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
3才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】

成 分 名	分 量 (1包18中)	働 き
ベラドリン20	0.67mg	自律神経に働いて、鼻みずの分泌を抑えます。
グリチルリチン酸	46.7mg	鼻粘膜の炎症を抑えます。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	2mg	アレルギー症状を抑え、鼻みず、くしゃみをしずめます。
塩酸ブソイドエフェドリン	60mg	血管収縮作用により鼻粘膜の充血を抑えて、鼻みず、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	50mg	頭重感をやわらげます。

添加物としてクエン酸、トウモロコシデンプン、乳糖、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、酒石酸、ステアリン酸M₈、セルロース、白糖、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝祭日を除く)



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>