



第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

鼻炎用内服薬

ストナリニS[®]

鼻炎（くしゃみ、鼻水、鼻づまり）に

- ストナリニSは、胃で溶ける外層と腸で溶ける内核からなる時間差作用の二重構造で、1日1～2回の服用ですぐれた効果をあらわします。
- ダツラエキスは、鼻汁分泌を抑え、鼻水などの鼻炎症状に効果をあらわします。
- のみやすい白色の糖衣錠です。



使用上の注意



してはいけないこと


（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



| 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------------|
| 皮 心 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | 頭痛 |
| そ の 他 | 排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ |

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
口のかわき、便秘

〔効 能〕

急性又はアレルギー性鼻炎による諸症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、頭が重い)の緩和

〔用法・用量〕

| 年 齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人(15才以上) | 1錠 | 1~2回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し
て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ
事故につながります。)



〔成分・分量と働き〕2錠中


| 成 分 | 分 量 | | 働 き |
|----------------|------|------|--------------------------------------|
| | 〈内核〉 | 〈外層〉 | |
| マレイン酸クロルフェニラミン | 6mg | 6mg | アレルギーによる鼻づまり、鼻水を抑えます。 |
| 塩酸フェニレフリン | 6mg | 6mg | 鼻粘膜のうっ血(血がとどこおること)やはれを抑え、鼻づまりを緩和します。 |
| ダツラエキス | 12mg | 12mg | 副交感神経に働いて、鼻炎による症状を改善します。 |



添加物として、リン酸水素Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、グリセリン脂肪酸エステル、セラック、白糖、グリセリン、タルク、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、炭酸Ca、酸化チタン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ポビドン、カルナウバロウを含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

