

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

塩酸プソイドエフェドリン配合

# プレコール® 鼻炎カプセルA

鼻炎用内服薬

### 〔プレコール鼻炎カプセルAの特徴〕

1. 塩酸プソイドエフェドリンが鼻づまりの原因となる鼻粘膜の充血やはれをおさえて、鼻づまりに優れた効果を発揮します。
2. 5種の成分がバランスよく働いて、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎の諸症状を緩和します。



### 〔使用上の注意〕



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難  
(3) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去たん薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去たん薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）
4. 長期連用しないで下さい



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人：高熱、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人：緑内障  
(8) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振         |
| 精神神経系 | めまい、不眠、神経過敏、頭痛     |
| そ の 他 | 排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称              | 症 状                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。 |

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい 口のかわき、便秘

### 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目、のどの痛み、頭重

### 【用法・用量】

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

| 年 齢       | 1回量       | 1日服用回数     |
|-----------|-----------|------------|
| 大人（15歳以上） | 1カプセル     | 3回<br>（食後） |
| 15歳未満     | 服用しないで下さい |            |

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



### 【成分・分量】

本剤は、淡緑色と白色のカプセルで、3カプセル中に次の成分を含有します。

| 成分                     | 含有量             | 働き                                |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 塩酸プソイドエフェドリン           | 105mg           | 鼻粘膜の血管を収縮させて、充血やはれをおさえ、鼻づまりを改善する。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩      | 4.5mg           | アレルギー症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目）をおさえる。  |
| ベラドンナ総アルカロイド           | 0.4mg           | 分泌抑制作用により鼻水やなみだ目をおさえる。            |
| 無水カフェイン                | 120mg           | 鼻炎に伴う頭重をやわらげる。                    |
| サイシン乾燥エキス<br>（サイシンとして） | 30mg<br>(300mg) | アレルギー症状をおさえる生薬。                   |

添加物：バレイショデンプン、乳糖、セルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、青色1号、ラウリル硫酸Na

### 【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電 話 03 (5205) 8331  
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

®登録商標



販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元  
佐藤薬品工業株式会社  
奈良県橿原市観音寺町9-2

SGF