

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

医薬品

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎に 小児用 ヒラミン®鼻炎シロップ

くしゃみ・鼻水・鼻づまりは、かぜの初期・急性鼻炎・アレルギー性鼻炎によく起こる大変不快な症状です。特に鼻炎の場合、原因が植物の花粉や塵、外気の急激な温度変化等、様々で、呼吸がしにくい、体力が低下して疲れ易い等、非常に辛い1日となります。

〈小児用ヒラミン鼻炎シロップ〉は、このような症状に効果の期待できる成分を配合し、服用し易く、吸収され易いシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)



相談すること

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状がある人
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

4. 長期連用しないでください

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人
緑内障
- (8) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏
そ の 他	排尿困難

続き

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、 胸苦しさ等とともに、顔色が青白 くなり、手足が冷たくなり、冷や 汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このよ
うな症状の継続又は増強が見られた場合には、
服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してくだ
さい

口のかわき

【効 能・効 果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次
の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づ
まり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用 法・用 量】

3才以上 7才未満 1回 5.0mL

1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用
してください。なお、必要により1日6回まで服用
することができますが、その場合には約4時間の間
隔をおいてください。

【用法・用量に関する注意】

- 3才未満の乳幼児には服用させないでください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督
のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を守ってください。

【成 分・分 量】 1日量（30mL）中

マレイン酸クロルフェニラミン 4 mg
塩酸ブソイドエフェドリン 60mg
無水カフェイン 50mg
その他、添加物として白糖、D-ソルビトール液、塩
化Na、L-グルタミン酸Na、クエン酸、安息香酸Na
及び香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原
因になったり品質が変わります）
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求め
の薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話（089）994-1333

受付時間 8:30～17:00
（土、日、祝日を除く）