

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎に 小児用 **ヒラミン® 鼻炎** シロップ

くしゃみ・鼻水・鼻づまりは、かぜの初期・急性鼻炎・アレルギー性鼻炎によく起こる大変不快な症状です。特に鼻炎の場合、原因が植物の花粉や塵、外気の急激な温度変化等、様々で、呼吸がしにくい、体力が低下して疲れ易い等、非常に辛い1日となります。

『小児用ヒラミン鼻炎シロップ』は、このような症状に効果の期待できる成分を配合し、服用し易く、吸収され易いシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (5) 葉によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人
縁内障
- (8) モノアミン酸化酵素阻害剤（塩酸セレギリン等）で治療を受けている人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	のまい、小眠、神経過敏
そ の 他	排尿困難

裏面へ続く

続き

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック 〔アナフィラキシー〕	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

3歳以上 7歳未満 1回 5.0mL

1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。なお、必要により1日6回まで服用することができますが、その場合には約4時間の間隔をおいてください。

【用法・用量に関する注意】

- 1歳未満の乳幼児には服用させないでください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を守ってください。

【成分・分量】 1日量(30mL) 中

クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg
(マレイン酸クロルフェニラミン)

塩酸プロソイドエフェドリン 60mg

無水カフェイン 50mg

その他、添加物として白糖、D-ソルビトール液、塩化Na、L-グルタミン酸Na、クエン酸水和物（クエン酸）、安息香酸Na、及び香料を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元：松田菓品工業株式会社

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

受付時間 8:30~17:00
(土、日、祝日を除く)