

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎に 小児用 ヒラミン®鼻炎シロップ

くしゃみ・鼻水・鼻づまりは、かぜの初期・急性鼻炎・アレルギー性鼻炎によく起こる大変不快な症状です。特に鼻炎の場合、原因が植物の花粉や塵、外気の急激な温度変化等、様々で、呼吸がしにくい、体力が低下して疲れ易い等、非常に辛い1日となります。
〈小児用ヒラミン鼻炎シロップ〉は、このような症状に効果の期待できる成分を配合し、服用し易く、吸収され易いシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の症状がある人
前立腺肥大による排尿困難
- 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- 医師の治療を受けている人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 高齢者
- 本人又は家族がアレルギー体質の人
- 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の症状のある人
高熱、排尿困難
- 次の診断を受けた人
緑内障
- モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏
そ の 他	排尿困難

続き

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷汗、息苦しき等があらわれる。

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかかわき

【効 能 ・ 効 果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

【用 法 ・ 用 量】

3歳以上 7歳未満 1回5.0mL

1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。なお、必要により1日6回まで服用することができますが、その場合には約4時間の間隔をおいてください。

【用法・用量に関する注意】

- 3歳未満の乳幼児には服用させないでください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を守ってください。

【成 分 ・ 分 量】 1日量(30mL)中

クロルフェニラミンマレイン酸塩4mg
塩酸ブソイドエフェドリン60mg
無水カフェイン50mg
その他、添加物として白糖、D-ソルビトール液、塩化Na、L-グルタミン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、及び香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

〔受付時間 8:30～17:00〕
(土、日、祝日を除く)