

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などによる 鼻みず、鼻づまりに

カイゲン点鼻スプレー

急性鼻炎やアレルギー性鼻炎は、鼻みず、鼻づまりやくしゃみなどの不快な症状を呈します。

カイゲン点鼻スプレーはスプレー式ですので、有効成分を鼻腔内に霧状に噴霧して鼻粘膜の炎症をおさえ不快な症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- (2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合


《効能・効果》

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

《用法・用量》

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回鼻腔内に噴霧してください。なお、3時間以上の間隔をおいて使用してください。

● カイゲン点鼻スプレーの使い方



《用法・用量に関連する注意》

- (1) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 点鼻用にのみ使用してください。

《成分・分量》

成 分	分量(100mL中)	作 用
ナファゾリン塩酸塩	50 mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	300 mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多をなくします。
リドカイン	100 mg	局所を麻酔して痛みや不快感を消失します。作用は確実で持続します。

※添加物として、パラベン、エタノール、pH調節剤、グリセリンを含有します。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 外箱に表示の使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン「お客様相談室」

電 話：06-6202-8911

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元

株式会社 カイゲン

大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元

株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地